






Figs 29-30 : Hélicométrie dicyclique dextrogyre chez un *Tenebrio molitor* L. (abdomen). — 29. Larve $\times 5$. — 30. Nympe $\times 5$.

Figs 31-32 : Hélicométrie tricyclique dextrogyre chez un *Tenebrio molitor* L. (abdomen). — 31. Larve $\times 5$. — 32. Nympe $\times 5$.




1, Trematoelitria unilateral en *Ergates faber*
(Cerambycidae)

2, Expansió protoràcica en *Anthaxia quadripunctata*
(Buprestidae)







Trematoelitria unilateral









Figs 49-50 : Pronotoschisis para-médian total. — 49. *Holonycha valida* Fairm., de la Montagne d'Ambre (Madagascar), $\times 12,5$ (Muséum Paris). — 50. *Tenebrio molitor* L. Effet de la cautérisation du centre de l'hémi-pronotum droit au dernier stade larvaire, $\times 8$.




Fig. VIII

24. *Otiorrhynchus atroapterus* De Geer, des Moutiers (Loire atl.) (L. AUBER leg., coll J. B.). Expansions prothoraciques subsymétriques (« alate prothorax »). a: vue générale de l'avant-corps, face dorsale. (X 12). b: vue latérale et légèrement inférieure de l'organe gauche, montrant la vésicule membraneuse (m) de l'orifice. (X 75). — 25. *Mastododera nodicollis* Klug, ♂, de Tananarive (LAMBERTON leg., Mus. Paris). Expansion prothoracique gauche avec ébauche de subdivision en articles. (X 10).



Expansió protoràcica dreta





CASTILLA-LEÓN
Pincha de la Sierra (Sierra
de la Demanda, BURGOS)
30TUM77 1.200-1.600 m
30. V. - 1. VI. 2009
Pérez De-Gregorio & M
Bravo *leg.*

